

Результаты исследования эффективности препаратов Fillerina для увеличения объёма груди

C. Angelinetta, F.M. Bianchi, S. Busoli Badiale, BIO BASIC EUROPE SRL

Результаты исследования опубликованы в International Journal for Applied Science, 11-2014

SOFW

Все системы измерения груди основываются на двух показателях:

окружность грудной клетки, под грудью (1) окружность груди (2), т.е. окружность грудной клетки на уровне груди. Эта мера, обозначающая размер бюстгалтера, выражается числом, которое указывает длину окружности грудной клетки, и буквой, которая соответствует объему груди (чашка).

Европа	65 см	70 см	75 см	80 см	85 см	90 см	95 см	100 см
Великобритания и США	30	32	34	36	38	40	42	44
Франция и Испания	80	85	90	95	100	105	110	115
Италия	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

Объём груди соответствует размеру чашки и обозначается буквой.

Размер высчитывается по следующей формуле:

окружность груди - (окружность грудной клетки + 12,5 см).

Если два размера одинаковы, чашка – «AA». Если разница 2,5 см, чашка – «A», если 5 см – «B», если 7,5 см – «C», если 10 см – «DD» если 12,5 см – «D» и т.д.

Буква чашки одинакова во всех странах.



0 см	2,5 см	5 см	7,5 см	10 см	12,5 см	15 см	17,5 см	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см	30 см	32,5 см	35 см	
AA	A	B	C	DD	D	E	F	G	H	II	I	JJ	J	KK	K

Исследования проводились для подтверждения эффективности действия препаратов путём проведения тестов in-vivo. Клинические испытания представлены тремя двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями с целью оценить эффективность препаратов Fillerina для увеличения объема груди и тонуса кожи.

В каждом исследовании принимало участие 40 женщин (всего 120) в возрасте от 18 до 40 лет с 1-м или 2-м размером груди и чашкой бюстгалтера AA/A/B. Женщины отбирались на основе определенных критериев, а затем были разделены на две одинаковые группы.



Волонтеры использовали продукцию в течение 60 дней.

Методология

Волонтеры использовали продукцию в течение 60 дней. Во время эксперимента были проведены следующие измерения:

Инструментальные параметры: измерение эластичности.

Антропометрические параметры: окружность груди; окружность грудной клетки; контроль веса тела; изменение размера чашки.

Клинические параметры: эффект увеличения объёма, упругость кожи.

В лабораторных условиях проводились измерения:

Контрольное измерение (Т0)

Через 15 дней после начала использования (Т15)

Через 30 дней после начала использования (Т30)

Через 45 дней после начала использования (Т45)



МЕДИНТОРГ
акционерное общество

LABO
LABO COSPROPHER

Тестирование 1

Волонтеры использовали только косметический крем 1 раз в день в теч. 60 дней без перерыва.

	T0	T15	T30	T60
Максимальное увеличение окружности груди		+ 1 см	+ 1 см	+ 1,5 см
Среднее увеличение окружности груди		+ 0,3 см	+ 0,68 см	+ 1 см
Эластичность		+ 12%	+ 19%	+ 22%
Увеличение чашки				4 из 20
Более объёмная грудь	% волонтеров	60%	80%	85%
Улучшение тонуса груди		55%	100%	100%

Количество испытуемых с увеличенным объёмом груди на момент окончания испытания: 85%.

Количество испытуемых с повышением тонуса груди на момент окончания испытания 100%.

Увеличение чашки: 4 из 20.

Тестирование 2

Волонтеры использовали тестируемый косметический препарат, **гель + крем** в течение первых 15 дней. В течение последующих 45 дней волонтеры использовали только крем 2 раза в день. Всего тестирование длилось 60 дней.

	T0	T15	T30	T60
Максимальное увеличение окружности груди		+ 1 см	+ 1,5 см	+ 2 см
Среднее увеличение окружности груди		+ 0,4 см	+ 0,73 см	+ 1,08 см
Эластичность		+ 21%	+ 23%	+ 26%
Увеличение чашки				5 из 20
Более объёмная грудь	% волонтеров	55%	85%	90%
Более плотная грудь		100%	100%	100%

Количество испытуемых с увеличенным объёмом груди на момент окончания испытания: 90%.

Количество испытуемых с повышением тонуса груди на момент окончания испытания 100%.

Увеличение чашки: 5 из 20.

Тестирование 3

Волонтеры использовали тестируемый косметический препарат, гель+ крем, в течение 60 дней.

	T0	T15	T30	T60
Максимальное увеличение окружности груди		+ 1 см	+ 1,5 см	+ 2,5 см
Среднее увеличение окружности груди		+ 0,33 см	+ 0,88 см	+ 1,45 см
Эластичность		+ 19%	+ 25%	+ 28%
Увеличение чашки				9 из 20
Более объёмная грудь	% волонтеров	50%	80%	90%
Улучшение тонуса груди		100%	100%	100%

Количество испытуемых с увеличенным объёмом груди на момент окончания испытания: 90%.

Количество испытуемых с повышением тонуса груди на момент окончания испытания 100%.

Увеличение чашки: 9 из 20.

