



Филлерина / Fillerina®

Гиалуроновая кислота 1 кДа • Гидролизованный гиалуронат натрия 5 кДа • Гидролизованная гиалуроновая кислота 50 кДа • Гиалуронат натрия 200 кДа • Гиалуронат натрия 2000 кДа • Кроссполимер гиалуроната натрия

Исследование эффективности неинвазивного филлера Филлерина

Тест in vivo

FU.04. C.SL-2012 / 1842

Ноябрь 2012 года

Для оценки эффективности применения неинвазивного препарата Филлерина при коррекции депрессий кожи (морщин), восстановлении объема скул и увеличении объема губ проводился тест in vivo.

В клиническом инструментальном рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании действия препарата на лицевые морщины и увеличение объема скул и губ участвовало 40 добровольцев — женщин в возрасте от 25 до 55 лет с возрастными признаками. Отмечались шероховатость кожи, уменьшение объема тканей, особенно на скулах и губах.

Половина участниц исследования применяли препарат Филлерина, половина — плацебо.

Результаты оценивались через 7/14/30 дней, а также через 3 часа после применения препарата Филлерина.

Для оценки использовались неинвазивные биоинженерные методы, позволяющие определить степень заполнения морщин, улучшения овала лица и увеличения объема скул и губ.

Препараты Филлерина и плацебо применялись в соответствии с инструкциями компании Labo:

- В течение 14 дней, утром или вечером, каждый день нанести 2 мл геля на морщины и мимические морщины, на область скул и на губы
- Гель следует оставить на 10 минут, чтобы активные ингредиенты «заполнили» область коррекции.
- Как только гель впитается, на кожу лица и шеи нанести 1–2 мл Питательной пленки дождаться полного впитывания
- В период с 15 до 30 дня наносить дневной, ночной крем и крем для губ



МЕДИНТОРГ
акционерное общество

Информация для специалистов
+7 495 921-25-15 | www.labo-russia.ru

LABO
LABO COSPROPHAR